

药捻疗法

药捻疗法是用药物做成的药捻,放入病变部位,以治疗疾病的一种方法。

民间多用来引流和祛腐,治疗病变部位较深、排脓困难的疮疡及痿管等。如清代外科学家祁坤编著的《外科大成》祛腐类方中写道:“毒深不能收敛者,以纸捻蘸玄珠膏送入疮口内,易于收敛,不致成漏。”现在,药捻疗法在外科治疗中应用甚广,无论在民间,还是在医院,都广泛采用。

操作方法

①根据疾病性质和部位,选择和配制药物,制成药液、药粉或药膏。

②再将药物做成药捻。药捻的做法是用消毒纱布1条,蘸预先配制好的药物即成。也可以将预先配制好的药物直接搓成条状。

③将药捻放在病变部位,1~2天换1次,或2~4天换1次,根据具体情况而定。

适应证

(一)肾虚耳聋:

①用巴豆仁、蜀椒、石菖蒲、全蝎、松香各等份,共研细末,用黄蜡熔化和诸药做成条状,放入耳内,每日换药1次。

②用葱白、大蒜、巴豆仁、松香、细辛各等份,共捣极碎,用黄蜡做成条状,放入耳内,每日换药1次。

(二)深部化脓性疮疡:常规消毒后,手术切开排脓,然后用以下药捻:

①用消毒纱布条,蘸玄珠膏做成药捻,一端放入疮疡深部,另一端留在疮之外,以便脓血外流。玄珠膏配制法:用木鳖子肉 14 枚,斑蝥 81 只,细柳枝 250 克,或加驴甲片 9 克,草乌 3 克,麻油 30 毫升,加水浸泡 7 日,再用文火煎煮。然后去渣,入巴豆仁 90 克,再放文火上煎煮。至巴豆变黑色,倾入钵内,研如泥,加麝香 0.3 克,搅匀,放罐内密闭备用。

②用消毒纱布条,蘸二味拔毒膏或三味拔毒膏(中成药)做成药捻,一端放入疮疡深部,另一端留在疮口之外。

③用消毒纱布条,蘸土霉素软膏、四环素软膏、红霉素软膏等做成药捻,放入疮疡深部,一端留在疮口。

④用消毒纱布条,蘸金银花液做成药捻,放入疮疡深部,一端留在疮口外。金银花液配制方法:取金银花 500 克,放入玻璃瓶中,然后加 95% 的酒精,将金银花淹没,浸泡 7 ~ 10 天,去渣,将药液澄清过滤,装瓶密封备用。

(三)化脓性中耳炎:如果中耳炎已穿孔而有脓液排出,此时治疗主要是清除脓液和保持排脓通畅。可用无菌小棉条或细纱布条放入耳内,湿了即换去,如此不断更换,不断引流,即可达到治疗目的。如配合使用耳内点滴药液,或耳内吹布药粉(详见“滴点”、“耳内吹粉”疗法)则疗效更佳。

禁忌证

上述适应证之外的疾病不宜用此法治疗。

注意事项

①作药捻的药物一定要与疾病相适应,也就是说,药物要对症,否则效果不佳。

②置放在病变部位的药捻,深浅度要适中,合理。作为疮疡和外科手术引流用的纱布药捻,随着伤口从内向外逐渐愈合,药捻的下放深度也应随着逐渐变浅。

③施术时要注意严格消毒,药捻要做到无菌,以防继发感染。

④此法可与药物疗法、外科手术疗法、滴点疗法、耳内吹粉疗法、外敷疗法等同时应用,以提高疗效。

滴 点 疗 法

滴点疗法是用药液(或药粉)滴或点耳、鼻、眼或其他部位以治疗疾病的一种方法。《鲟溪外治方选》载,用甘草、冰片化水滴眼角来治伤寒无汗。吴尚先《理渝骈文》用生姜汁、茵陈汁点眼以治湿热黄疸;用丁香柿蒂汁点眼以治阴性呃逆;用犀角、朴硝等药点眼以治疗瘟疫;用翠衣散点眼以治腰痛;用王瓜挖空,装明矾于内,挂风处,候霜出点眼以治心痛。其他一些中医文献还载有用硼砂等药点眼治闪挫腰痛;用五圣散或己戌丹点眼治狂犬咬伤和毒蛇咬伤等。

操作方法

- ①根据疾病性质选择或配制适合病情的药液或药粉。
- ②视病变部位以确定患者体位。
- ③根据疾病部位与性质来确定滴鼻、点眼、滴耳或是滴点其他部位。

适应证

(一)感冒鼻塞不通:用1%麻黄素溶液滴鼻,两鼻孔不通滴双