

经或性欲闭塞性神经衰弱,怀孕,便秘,消化不良,胃脘受凉,过多饮用浓茶,长期饮酒,思虑过多,用脑过多,伤寒腐败物质增多,类风湿性关节炎均可成为诱发本病之因素。症见胃脘刺痛,多发于半夜,饿时发作,进食得缓,但有时相反;腹胀肠鸣,胃痛暖气,胃反酸水,恶心呕吐等。治宜除因止痛为主。宜用热敷胃脘,若疼痛较重者,温开水加盐内服催吐或胃脘处划皮拔罐。若胃脘气疼,频繁暖气者,宜用食盐、小麦皮、阿育魏实取等量用盐炒热外敷于胃脘处。亦可将洋乳香研细与热维改尼巴达木油调成糊状外敷。方用艾热克巴地洋蒸露、艾热克朱维乃蒸露、艾热克拉亲大乃蒸露合并内服。朱瓦日西库木尼消食膏与上述蒸露同服。

(阿不里米提·买买提编写 李雍译  
阿不都热依木·卡地尔编译)

## 胃下垂

本病维吾尔医学名为依斯提尔哈依买衣代,是指胃脘下垂为主要特征的病证。多见身高体瘦或体弱多产妇女。病因多由在各种体内外不良因素影响下,发生全身衰弱,导致胃肌筋松弛所致。凡营养不良,胃纳不佳,各种消耗性疾病,多产羸瘦等均可成为诱发本病之因素。

症见饭后胃脘不适,胃重胃灼,腹胀腹痛,有时胃脘暖气,腹部刺痛,有时呕吐,腹泻便秘,自觉胃脘下垂感,并感到气虚乏力,大便多而臭,细查可伴有子宫脱垂、肾下垂等,有时伴有肺结核,神经衰弱,贫血等。治宜除因补身,肥体强身为主。方用可从朱瓦日西欧德消食膏、伊提日非力开比日诃子膏、伊提日非力赛格日诃子膏等中选一种内服。鸡内金粉与谢日比提阿那尔糖浆、谢日比提比也糖浆同服。亦可方用木热巴衣艾力勒果浆、木热巴衣阿米勒果浆、苏福非斤散等内服。亦可方用艾热克古拉比蒸露加小豆蔻煎汤饭后内服。胃脘外壁涂热维改尼买斯提克油、热维改尼那尔丁油等。多食羊羔肉、鱼、鸡蛋、牛奶、奶皮、酸奶及各类蔬菜等。忌食卷心菜、洋芋、胡葱等。洋芋可用蔓菁代,胡葱可用洋葱代。

(阿不里米提·买买提编写 李雍译  
阿不都热依木·卡地尔编译)

## 胃痉挛

本病维吾尔医学名为台先努吉买衣代,是指胃肌部分或全部痉挛为主要特征的病证。病因多由各种体内外不良因素损害胃脘神经所致。凡胃功能紊乱,胃胀、胃中酸液增多,进食难消化食物,晨早空腹

饮凉水等均可成为诱发本病之因素。症见胃脘剧痛难忍,按压痛处痛彻后背及胛骨,若进食后发作可出现呕吐,但本病多为晨早及空腹时发作。若晨早空腹发作者,可食干馕、饼干或热敷,疼痛即可缓解。方用斯日坎吉本白祖日阿日醋糖浆加减内服,亦可参照方用治疗胃痛和其他治疗痉挛疾病的制剂。

(阿不里米提·买买提编写 李雍译  
阿不都热依木·卡地尔编译)

## 呃逆

本病维吾尔医学名为福瓦克,是指胃气上逆,频繁作呕,不能自制为主要特征的症状。病因多由各种体内外不良因素损害胃脘,引起胃气上逆导致膈肌痉挛所致。凡突然受寒,寒气相袭,热气一时不能伸展;饮食不节,进食过快,饮水过急,损伤胃气;情绪不佳,暴怒犯胃,重病后期等均可成为诱发本病之因素。重病后期有此症者,皆是病情较重的不良征兆之一。症见有节律性频繁呃逆不能自制,有外感受寒,饮食不节,情志不和等史。治宜生热降气,止呃止逆为主。吸受寒气,进食或饮水过急偶然发作者一般不必治疗,过片刻气顺则得缓,或可试大惊患者,热气伸展,使得止呃,或深吸空气,不呼片刻或饮用少量凉水,或后背中间划皮拔罐均可治呃。宜用小豆蔻连皮煎汤内服;黑种草子与牛脂同食;取洋乳香、绿豆等研粗包成纸条点火,吸入烟气;海狸香、黑种草子研细与蜂蜜及谢日比提斯依比糖浆同服;去皮甘草根研细与冰糖合并以谢日比提巴地洋糖浆、谢日比提比乃非谢糖浆送下。进食即呃者,温开水加稍许食盐内服催吐后,内服古丽坎尼克孜力古丽花膏;呃逆较重者取干姜6g、黑胡椒5枚煎水内服。

(阿不里米提·买买提编写 李雍译  
阿不都热依木·卡地尔编译)

## 重度消化不良

本病维吾尔医学名为苏依艾孜米西代地,是指消化功能严重失调,上吐下泻为主要特征的病证。病因多由在各种体内外不良因素影响下,体液失衡(多为胆液质或血液质偏盛),气质失调,损害胃脘所致。凡暴食暴饮,误食变质食物,多食未熟生果蔬菜、硬肉和腺体或身患胃溃疡、胃癌、胃炎等均可成为诱发本病之因素。

症见胃脘不适,胃中反酸,恶心呕吐,吐物先带未消化食物,后带黏液,舌干苔厚,口臭烦渴,纳呆厌食,腹部绞痛并有腹泻,时有便秘,胃区有压痛,有时伴有抽痛感,小便赤黄,尿量较少,沉淀较多,脉细而

数。治宜平衡体液,调整气质为原则;清胃止痛,降胆清血,补胃助化为主。血液质偏盛者,如无阻塞可用放血或背后划皮拔罐。胆液质偏盛者,少许呕吐以便清胃,并停食一昼夜。口渴者可饮凉饮或宜用湿寒性糖浆或蒸露冷服。若体质较虚者,灌肠给养,少量饮用冷冻酸奶等。若疼痛较重者,罌粟壳煎煮,取药渣温敷胃区。胆液质偏盛者,宜用新鲜龙葵叶、苜蓿叶等量各取汁 48 ml 与等量谢日比提 白祖日糖浆合并内服。便秘者,方用谢日比提 迪那尔糖浆内服。平衡体液、调整气质,宜用天山董菜、苜蓿子、白蜀葵子、金盏花子、玫瑰花、龙葵子、小茴香、苜蓿根各 6 g,浸泡在艾热克木库蒸露中过一夜,次日煎沸一次加谢日比提 白祖日 木提地力 糖浆 24 ml,内服 6 天,第 7 天上方加清泻山扁豆 72 g、古丽坎尼 克孜力古丽 花膏 48 g、巴旦杏仁 9 枚,谢日比提 白祖日 木提地力 糖浆换为谢日比提 迪那尔糖浆内服,然后内服库日斯 克孜力古丽 片 5 g,新鲜龙葵叶、苜蓿叶取汁 50 ml 与谢日比提 白祖日 木提地力 糖浆 50 ml 内服。膳食可用大麦稀饭、绿豆稀饭、大米稀饭等。胃纳好转后,可多食无核红葡萄,并饮水可代用艾热克 木库 蒸露、艾热克 卡森 蒸露、艾热克 高孜班 蒸露等。

(阿不里米提·买买提编写 李雅译  
阿不都热依木·卡地尔编译)

## 慢性胃炎

本病维吾尔医学名为外热糜 买衣代 木孜满,是指胃脘长期发生炎肿为主要特征的病证。病因多由在各种体内外不良因素影响下,体液失衡(多为黏液质偏盛)、气质失调、损害胃脘,从而引起胃下腺体功能异常使其产生浓性黏液所致。凡饮食不调即长期多食难消化食物(甜食、油腻食物、浓茶、药茶、咖啡等),长期饮酒,饭后饮用大量凉水或水果,食物过热或过冷,边食边劳动或暴食少动,或长期便秘或情志内伤,常患口腔疾病和某些心、肺、肝、肾等疾病,关节炎、类风湿性关节炎、梅毒等均可成为诱发本病之因素。

症见胃纳不佳,消化不良,饭后胃胀、胃烧,嗝气烦躁;时有胃痛、恶心呕吐,腹胀肠鸣,胃区压痛,口臭流涎,头痛口干;时有腹泻气多,食杂不化;时有便秘,心悸失眠,五心烦热,面色萎黄,日久羸瘦,身困体乏,多愁善感,小便赤短,沉淀较多,舌质淡红,舌苔厚腻。治宜成熟和清除致病体液,平衡体液,调整气质为原则,消炎补胃为主。成熟致病物质宜用天山董菜、苜蓿根、龙葵子、小茴香、小茴香根、无核红葡萄、大菟丝子与适量水煎汤,分两次早晚各加古丽

坎尼 克孜力古丽 花膏内服,本方为一日用量,应服 7 天。排泻被成熟的致病体液,第 8 天上方加无花果、玫瑰花、盒果藤根皮、罗望子环状肉汁、刺糖、甜巴旦仁煎汤内服。致病体液被清除后,若无热者,先方用买朱尼 代比都力 外尔德 蜜膏内服,后服用艾热克 木库 蒸露,艾热克 卡森 蒸露加谢日比提 白祖日 木提地力 糖浆内服。若有热者,先方用买朱尼 代比都力 外尔德 蜜膏改为库日斯 克孜力古丽片内服,后服用艾热克 木库 蒸露或淬铁水。调节饮食,忌食难消化食物及辛辣食品或烟酒、浓茶、咖啡等。多食易消化食物,如牛奶、稀饭,加绿豆、黄豆稀饭等。

(阿不里米提·买买提编写 李雅译  
阿不都热依木·卡地尔编译)

## 胃脓疮

本病维吾尔医学名为都白力土力 买衣代,是指胃脘发生脓性溃疡为主要特征的病证。病因多由在各种体内外不良因素影响下,体液失衡,胆液质或血液质偏盛损害胃脘,积郁胃内,日久化脓所致。凡孕期伤寒性胃炎、胃脘恶性疮疡等,均可成为诱发本病之因素。症见胃脘跳痛,呕吐,多有腹泻,发热谵语,摸胃区有肿块并有热感,脓疮化脓时可见卒然恶寒,颤抖恶心,口吐带脓臭物或腹痛泻下,便中带脓血,自觉炎肿退消等。治宜成熟和清除致病体液,平衡体液,调整气质为原则;化脓消炎,生肌补胃为主。宜用相应的成熟剂成熟偏盛的胆液质,而后宜用相应的排泻剂清除被成熟的胆液质。化脓宜用胡桐泪、净炼硼砂、穆库没药研细合并与西热衣 热西 黑提米 黏汁、艾热克 古拉比 蒸露、艾热克 巴地洋 蒸露口服 3 次。排脓方用买朱尼 阿亚热吉 排克拉蜜膏与艾热克 卡森 蒸露同服。生肌,宜用乳香、石榴花、玫瑰花、琥珀、赤石脂、奇诺等量研粗内服,每日 3 次,每次 3 g。补胃,宜用加蒔蓂子、葫芦巴的母鸡肉和汤内服。

(阿不里米提·买买提编写 李雅译  
阿不都热依木·卡地尔编译)

## 吐血

本病维吾尔医学名为开依 欧代米,是指胃及食道血管损伤而致呕或咯大量鲜血或紫黯血液为主要特征的病证。病因多由各种体内外不良因素影响下,如外伤、受热、负荷用力引起胃及食道血管破裂所致。凡外伤肝、脾,导致胃内充血或身患胃溃疡、胃癌、肝萎缩、肝硬化等引起胃血管受伤,并均可成为诱发本病之因素。