

止痛为主。若受寒者局部热敷；清除，方用艾比 阿亚热吉 排克拉 小丸内服。止痛，方用从买朱尼 白尔西夏 蜜膏，台日亚克 法如克 解毒膏、艾比西法 小丸等中选一种内服。病情好转后，巩固疗效，方用买朱尼 木赛克 蜜膏内服一段时期。

(阿不里米提·买买提编写 李雍译
阿不都热依木·卡地尔编译)

胆液质性肠绞痛

本病维吾尔医学名为库仑吉 赛非拉维，是指胆液质偏盛为主要特征的肠绞痛。病因多由在各种体内外不良因素影响下，体液失衡，气质失调，浓性胆液质偏盛，并大量流窜肠内，刺激肠道所致。

症见起病较慢，恶心、呕吐、吐物带蓝色或淡黄色胆液质物，大便秘结；若绞痛、腹胀、便秘时间过长可引起黄疸；本病阵发继续几小时或几天，若阵发性绞痛时间过长可导致肠道发炎，应当提高警惕。有的体质较弱者绞痛较重时可发生昏迷。本病病程一般为15—20天，有的几个月甚至几年，并变为周期性。治宜清除黑胆质，止痛解痉为主。清除胆液质，宜用新鲜龙葵汁、清泻山扁豆泡于开水中过滤，加热维改尼 巴达木 油内服；亦可方用无花果3枚、大枣7枚、破布木果11枚、乌梅7枚、白蜀葵子6g煎汤，加清泻山扁豆60g、热维改尼 巴达木 油6g内服或上方煎汤加热维改尼 比乃非谢 油灌肠。而后乌梅5枚、罗望子36g浸泡于开水中，加谢日比提 尼鲁法尔 糖浆内服。若恶心呕吐者，上方加斯日坎吉本36g内服。多食菠菜、葫芦及酸味食物，食用鸡肉汤等易消化食物。

(阿不里米提·买买提编写 李雍译
阿不都热依木·卡地尔编译)

铅中毒性肠绞痛

本病维吾尔医学名为库仑吉 日萨斯，是指铅中毒为主要特征的肠绞痛。凡从事铅制造业、染料业，铅器皿制造，铅字铸造或用铅盒吃饭用水，日久身处有铅的环境等，均成为诱发本病之因素。症见除了肠绞痛外伴有腹部时有痉挛，背及四肢疼痛，食欲不振，纳少，日见消瘦，臂肌麻痹，齿龈呈现出青色线条，乏力贫血，多有腹泻，月经不调等。治宜除铅毒，止痛解痉为主。清除铅毒宜用盒果藤根皮、秋水仙、牵牛子各5g，番泻叶、黄河子各12g研细，加热维改尼 巴达木 油5g，搅拌与开水冲服。解痉止痛，方用苏福非 苏仁江 散、买朱尼 苏仁江 蜜膏等内服。若疼痛较重时坐热浴，热敷腹部，肥皂水灌肠等。严格企业集体和个人卫生，注意空气流通，不在

工作场地吃饭。

(阿不里米提·买买提编写 李雍译
阿不都热依木·卡地尔编译)

肝气质热性失调症

本病维吾尔医学名为苏依 密杂吉 阿日 开白地，是指肝气质热性偏盛为主要特征的病证。病因多由在各种体内外不良因素影响下热性偏盛，导致肝气质失调所致。凡多食肉和营养较强的食物，多食热性作料饭食，大量饮酒，受热中暑，长期便秘，多休少动，疟疾中毒，月经不调，肝外伤，胆结石等均可成为诱发病之因素。本病亦称非体液型热性肝气质失调症，它相当现代医学中的急性肝炎。症见肝区隐痛，肝稍肿大，消化不良，恶心纳少，大便干结，有的眼白轻度发黄，有的半夜腹泻，右肋疼痛等。若不及时治疗可导致变为肝气质寒性失调(慢性肝炎)。治宜缓泻通便，降肝之热，调整肝气质为主。然后宜用莲花、苜蓿根、苜蓿子、马齿苋子、龙葵实、白檀香、小檗实各5g，罗望子12g煎汤加谢日比提 孜日克 糖浆、谢日比提 阿那尔 糖浆或谢日比提 白祖日 糖浆内服。方用库日斯 卡福尔 片与酸奶同服。忌食油腻厚味，热性作料饭食、牛奶、冰糖、阿力瓦糖糊、辣椒等，要劳逸结合。

(阿不都热西提·依不拉克编写 李雍译
阿不都热依木·卡地尔编译)

胆液质性肝炎

本病维吾尔医学名为也尔卡尼 赛非拉维，是指胆液质偏盛为主要特征的肝炎。病因多由各种体内外不良因素影响下，体液因胆液质的偏盛而失衡，导致肝气质体液型干热性失调，损害肝脏所致。

症见除了肝炎共有的肝区疼痛、食欲不振、恶心乏力等症外，且有口渴较重、大便燥结，伴有肝区烧痛、热性偏盛较其他体液偏盛所致的肝炎较严重等。治宜成熟和清除偏盛胆液质，平衡体液，调整肝气质为原则，降热通便为主。成熟体液，宜用新鲜苜蓿叶汁、新鲜龙葵叶汁各8ml与谢日比提 白祖日 糖浆加古丽坎尼 比乃非谢 花膏内服；亦宜用天山莖菜6g、苜蓿9粒、苜蓿子、苜蓿根、玫瑰花、白葵子、金盏花子、龙葵实各6g浸泡于开水中过一昼夜，次日过滤加新鲜苜蓿叶汁和新鲜龙葵叶汁各48ml、古丽坎尼 克孜力古丽 花膏48g内服。清除，宜用上方加清泻山扁豆6g，谢日比提 台然吉本 糖浆、谢日比提 迪那尔 糖浆各48ml，巴旦杏仁7粒内服。降热通便，方用买朱尼 达瓦衣 米西克 巴日德 蜜膏5g与苜蓿子、龙葵子、黄瓜子仁、甜瓜子仁各6g

浸泡在艾热克 木库 蒸露 60 g 中,溶出黏液加谢日比提 比乃非谢 糖浆 24 ml、罗勒子 3 g 同服;莒菊、龙葵与新鲜龙葵汁调成糊剂加热维改尼克 孜力古丽 油 24 ml、葡萄醋 6 ml,少许樟脑外敷于局部。

(阿不都热西提·依不拉音编写 李雅译
阿不都热依木·卡地尔编译)

血液质性肝炎

本病维吾尔医学名为也尔卡尼 代米维,是指血液质偏盛为主要特征的肝炎。病因多由各种体内不良因素影响下,体液因血液质的偏盛而失衡,导致肝脏气质体液型湿热性失调,损害肝脏所致。

症见除了肝炎共有的肝区疼痛、食欲不振、恶心乏力等症之外,具有发热、便秘、肝区沉重、呃逆反酸、呕吐、时有昏迷、四肢厥冷等。治宜清除偏盛血液质,平衡体液,调整肝脏气质为原则;清血利尿,软便通便,降肝之热为主。清除偏盛血液质若无不适症,可从有关静脉中放血,若患者为 14 岁以下 60 岁以上者则不能放血,而肝区可放水蛭吸血;清血利尿宜用龙葵叶汁 48 ml、莒菊叶汁 48 ml 与谢日比提 白祖日 糖浆合并内服。软便通便,宜用莒菊子、黄瓜子仁、甜瓜子仁、西瓜子仁、刺疾痢子仁各 6 g 浸泡在艾热克 木库 蒸露中溶出黏液与谢日比提 白祖日 木提地力 糖浆同服。降肝之热,方用早晨服 库日斯 孜日克 片 4 g,晚间宜用莒菊子、龙葵实各 6 g 与莒菊叶汁、龙葵叶汁各 48 ml 同服。亦可代用谢日比提 白祖日 糖浆或合米日 买日瓦日德 糖膏或谢日比提 迪那尔 糖浆内服。

(阿不都热西提·依不拉音编写 李雅译
阿不都热依木·卡地尔编译)

黏液质性肝炎

本病维吾尔医学名为也尔卡尼 白里海密,是指黏液质偏盛为主要特征的肝炎。病因多由各种体内不良因素影响下,体液因黏液质偏盛而失衡,导致肝脏气质体液型湿寒性失调,损害肝脏所致。症见除了肝炎共有的肝区疼痛、食欲不振、恶心乏力等症之外,具有不发热、肝痛较轻、肝脏沉重、舌质淡、苔白腻、小便清长等。治宜成熟和清除偏盛的黏液质平衡体液,调整肝脏气质为原则,利尿去湿,通便生热为主。先宜用相应的蒙孜吉 白里海密 成熟剂成熟致病黏液质后,宜用相应的木斯力 白里海密 排泻剂清除被成熟的黏液质。然后利尿去湿,方用斯坎吉 白祖日 阿日 醋糖浆加芹菜子、洋茴香、阿育魏实、莒菊根等内服。通便生热,方用艾比 阿亚热吉 排克拉小丸加阿里红,温水调成灌肠液灌肠;亦方用从买朱

尼 代比都力 外尔德 蜜膏、买朱尼 达瓦衣 米西克 蜜膏、库日斯 孜日克 片等中选一种内服。

(阿不都热西提·依不拉音编写 李雅译
阿不都热依木·卡地尔编译)

黑胆质性肝炎

本病维吾尔医学名为也尔卡尼 赛危大维,是指黑胆质偏盛为主要特征的肝炎。病因多由体内各种不良因素影响下,体液因黑胆质偏盛而失衡,导致肝脏气质体液型干寒性失调,损害肝脏所致。症见除了肝炎共有的肝区疼痛、食欲不振、恶心乏力等症之外,具有疼痛不重,但肝脏硬化、面色黯黑、舌干等。治宜成熟和清除偏盛的黑胆质平衡体液,调整肝脏气质为原则,消炎软坚为主。成熟偏盛黑胆质宜用莒菊、玫瑰花各 7 g,无核葡萄 9 粒,地锦草、莲花各 6 g,龙葵实 7 g 煎汤与谢日比提 白祖日 糖浆同服 6—7 天。清除被成熟的黑胆质上方加番泻叶 9 g,古丽坎尼 克孜力古丽 花膏、古丽坎尼 比乃非谢 花膏各 48 g,巴旦杏仁 7 枚内服。亦可方用从买朱尼 代比都力 外尔德 蜜膏、谢日比提 白祖日 糖浆、库日斯 孜日克 片、库日斯 古丽赛格日 片等中选一种内服。消炎软坚,宜用苦艾、穆库没药、野苜蓿、玫瑰花、甘松、乳香、芦荟、洋甘菊研细,过筛与龙葵实汁调成糊剂外敷于肝区。若肝脏硬化较重,上方加牛骨髓、热维改尼 克孜力古丽 油、白腊外敷于肝区。多食鸡汤、大米稀饭,忌食油腻,难消化及干寒性食物。

(阿不都热西提·依不拉音编写 李雅译
阿不都热依木·卡地尔编译)

肝绞痛

本病维吾尔医学名为库仑吉 开白地,是指肝区绞痛为主要特征的病证。病因多由胆囊发生结石或胆囊发炎所致。凡过量摄食肉油、酗酒,促使分泌胆汁增多,造成胆汁热性和负压增加,逐渐导致胆汁液化,其液化部分日久不断凝结成小块或胆汁液化后沉着滞留逐渐变为胆囊结石;凡多食热性食物、多吃肉食、烤肉、酗酒、体胖少动等均可导致肝脏热量偏盛,促使胆汁分泌过量,损害胆囊,引起胆囊的发炎;肝绞痛有时亦可由持续性便秘所致。

症见右侧肋间突发绞痛难忍,疼痛放射至腹、胃、后胸及右侧颈部,恶心反酸或呕吐,时有呃逆、腹胀便秘,面黯恍惚,脉迟;若绞痛加剧可发生昏迷;若胆石阻塞胆管可引起全身性黄疸。治宜通阻止痛,溶解排石为主。通阻,方用朱瓦日西 再尔欧尼 消食膏与菟丝子、洋茴香、黄瓜子仁浸泡在开水中取之黏