

加白蜡加热涂于腰部;宜用白蜀葵花、洋甘菊、野苜蓿、葫芦巴、亚麻子、大麦各 30 g 研细加蓖麻油加热敷于腰部。湿寒性偏盛者,可先服用艾比 阿亚热吉排克拉 小丸清除体内多余的黏液质后,方用买朱尼 马提土力 阿亚提 蜜膏与艾热克 巴地洋 蒸露同服;亦可方用买朱尼 苏仁江 蜜膏内服。

(吐尔迪阿吉编写 李雍译
阿不都热依木·卡地尔编译)

肋间神经痛

本病维吾尔医学名为外吉欧力 艾萨比 白乃艾孜拉,是指肋间神经疼痛为主要特征的病证。病因多由肋间神经发生炎肿所致。凡妇女经水不下、性欲滞于宫内、身患瘕病等均可成为诱发本病之因素。症见腰痛连肋,按则得缓等。治宜调整气质为原则,除因止痛为主。宜用刺山柑皮、小茴香根皮各 30 g,芹菜子根、芹菜子、菟丝子、小茴香各 3 g,香茅 12 g,香桃木实、欧细辛、欧龙胆草各 6 g,没药树枝、布孜当、肉桂、骆驼蓬子各 10 g 煎汤内服;方用热维改尼 库斯台 油涂于患处;亦可方用买朱尼 散吉日那 蜜膏内服。

(吐尔迪阿吉编写 李雍译
阿不都热依木·卡地尔编译)

疔

本病维吾尔医学名为都拜力 海力维热克,是一种发生于皮肉之间的急性化脓性疾病。本病发无定处,随处可生,但多发于颈、背、臀等部位。病因多由在体内外各种不良因素影响下,体液失衡,气质失调,过浓血液质或腐败的血液中渗入异常黏液质,损害肌肤所致。凡不注意皮肤卫生,身患结核病、糖尿病等消耗性疾病等均可成为诱发本病之因素。症见初起局部红肿热痛,红肿以中心部明显,而周围较淡,逐渐扩大,范围多在 3—4 寸左右,边缘不清,且有硬结,数日后局部化脓,小则化脓 3—4 处,多则 8—10 处,溃后,脓出黄白稠厚,肿消痛减,而逐渐愈合,或中软不溃,伴有畏寒发热,食欲不振等。治宜平衡体液,调整气质为原则;清血解毒、软坚消炎为主。应用相应的成熟剂成熟致病体液,并应用相应的排泻剂清除被成熟的体液。清血解毒,方用买朱尼 确比其尼 开比日 蜜膏、买提布合 比乃非谢汤、台日亚克 开比日 解毒丸、台日亚克 艾非阿 解毒丸等内服。软坚消炎,方用热维改尼 再屯 油,热维改尼 古丽 油与牛内脏脂肪敷于患处。若不化脓不退肿,全身性症状加重,可采用手术进行排脓,并应用收敛生肌药,宜用梯、石榴花、没食子、铁线蕨、

甘草味胶等研细外用于创口。

(祖农卡日编写 阿不都热依木·卡地尔编译)

鼠疮

本病维吾尔医学名哈那孜尔,是指多发生于颈部、锁喉、腋下腺体的化脓性痛。发生于颈部,则称颈痛;发生于颈前正中结喉处,则称锁喉痛;发生于腋窝者,则称腋痛。颈痛相当于现代医学中的颈淋巴结结核。因初起局部结块圆形或椭圆形,边界清楚,手摸结块时似与老鼠样四处乱跑,故得鼠疮一名。病因多由在各种体内外不良因素的影响下,体液失衡,气质失调,异常过浓的腐败黏液质,凝结停留于腺体所致或异常腐败黑胆质,损害于腺体所致。本病多见于儿童。

(1) 颈痛:症见初起于颈侧,或颌下、耳后、颌下,可发现结块如鸡蛋,白肿、灼热而痛,逐渐漫肿坚实,焮热疼痛,伴有寒热、头痛、颈强、全身不适,4—5 天后,发热不退,皮色渐红,肿势高突,疼痛加剧等,此欲酿脓,压按之中,软而有波动感者,此已成脓,溃后,脓出黄白稠厚,肿消痛减,而逐渐愈合。

(2) 锁喉痛:症见初起红肿绕喉,肿势散漫不聚,坚硬灼热疼痛,继则肿势可延及颈部两侧,上及腮颊,下至胸前;若肿势渐趋局限,按之中软者,为脓已成,应及时切开引流。

(3) 腋痛:症见初起腋下结块暴肿,皮色不变,灼热疼痛,伴有恶寒发热,食欲不振等;若疼痛日增,寒热不退,根脚收束,肿势高起,势必酿脓;若溃后脓泄欠畅,肿势不退,须及时扩大切口,使引流通畅,否则迁延日久,难以收口。治宜平衡体液,调整气质为原则;消炎退肿,软坚散结为主。平衡体液,调整气质,先应用相应的成熟剂成熟致病体液,宜用薰衣草、香青兰、小茴香、小茴香根、地锦草、龙葵实、洋茴香、无花果、去核葡萄、蜂蜜等煎汤内服 3 天;致病体液成熟后,应用相应的排泻剂清除被成熟的致病体液,方用阿亚热吉 排克拉 苦膏加阿里红、药西瓜、甘草味胶、盒果藤根皮、格逢脂、脑砂、司格蒙旋花脂等研细,过箩,用韭菜汁制成胡豆大小的丸剂内服。消炎退肿,软坚散结,宜用野大蒜、没药穆库、刺山柑根皮等研细,过箩,用葡萄醋、蜂蜜制成软膏涂于患处;亦可宜用芥子、无花果、海螵蛸、没药穆库、阿摩尼亚脂、白醋等用橄榄油制成软膏涂于患处。方用买日合米 达合力云 软膏、买日合米 如苏力 软膏涂于患处。亦可用去毒全蝎、地龙、甘草研细过箩与蜂蜜制成小丸内服;亦可方用买朱尼 锁木 蜜膏、伊提日非力 胡地 诃子膏内服。促使成脓,溃脓收敛,方用买日合米 合那 软膏、买日合米 合拉非 软膏涂于

患处。采取上述内外治法用药 1—2 月未见疗效,就应及时采取手术治疗。

(祖农卡日编写 阿不都热依木·卡地尔编译)

疗疮

本病维吾尔医学名为海拉吉,其抗,是指多生于颜面、手足部的形小根深如钉,发病迅速,反应剧烈的急性感染性疾患。病因多由在体内各种不良因素影响下,体液失衡,气质失调,腐败血液或过浓血液中渗入异常黏液质,损害皮肤所致。凡不注意皮肤卫生,抓破皮肤,肤表擦伤,恣食厚味,醇酒辛辣或身患结核病、糖尿病等消耗性疾病发生体质虚弱等均可成为诱发本病之因素。其特征是疮形如粟,坚硬根深,如钉钉之状,随处可生,好发于颜面、手足部位等。因由面部血管丰富,炎症反应剧烈,病变迅速,如不及时治疗,或处理不好,容易发生疗毒走黄,而导致生命危险。症见皮肤上有粟粒样脓头,或痒或麻,根深坚硬,形如钉钉之状,周围红肿热痛明显,重者有恶寒发热,全身不适等症。治宜平衡体液,调整气质为原则;清血解毒,软坚消肿,清热排脓为主。清血解毒,方用买提布合 比乃非谢 汤、买朱尼 确比其尼 蜜膏等内服。软坚消肿,宜用石灰、芝麻油、蛋清调成糊剂外敷;亦可用亚麻车前子、马齿苋叶、车前叶研细与艾热克 古拉比 蒸露调成糊剂外敷。清热排脓,宜用小麦发酵面、蓝鸽子粪、石灰等研细用蛋黄调成糊状外敷;方用从买日合米 达黑力云 软膏、买日合米 星日皮 软膏、买日合米 欧晒克 软膏等中选一种外用。收敛愈创,宜用没药、芦荟、没食子、姜黄研细过筛外用于创口。

(祖农卡日编写 阿不都热依木·卡地尔编译)

褥疮

本病维吾尔医学名为克如衣 排拉西,久病卧床,压迫成疮,称为褥疮。以臀部、背脊、骶尾、枕部和足跟等突出易受压迫及摩擦的部位最为常见。病程较长,多见于昏迷或外伤、中风等而致截瘫,偏瘫的病人。病因多由久病卧床,使臀部、背脊、骶尾、枕部和足跟等突出易受压迫及摩擦的部位长期受压,局部血液循环不良,营养物质不足,第四消化即局部代谢产生的废物,未能通过静脉运送达到排泄器官排出到体外,而引起凝滞,导致肌肤失养,损害局部皮肤所致。初起可见局部皮肤发红、紫黯,迅速形成干黑色腐肉、不痛,此时避免再受压和积极治疗,多能获愈;若延误失治或染毒则黑腐蔓延,溃疡日渐深大,脓出臭而稀薄,如粉浆污水,四周形成空壳,日久每致伤筋损骨。常伴神疲发热、食欲不振等症。初起

皮肤潮红者,宜先解除局部压迫,进行按摩,而后宜用如苏提、阿拉伯树脂、禹良土、没食子、石榴花等研细,过筛与各类油剂调成糊状敷于局部。若冬季宜用葡萄醋或艾热克 古拉比 蒸露擦于患处。若局部皮肤损伤,溃面较大,腐肉较多,可方用买日合米 依斯皮达吉 软膏涂于患处,去腐生肌,待脓尽疮面清洁后再用收敛药收口,并加强护理。

(祖农卡日编写 阿不都热依木·卡地尔编译)

烧伤

本病维吾尔医学名为艾日因那尔,是指在火焰、灼热的气体、液体或固体,雷及电、药物等的作用下人体发生的烧伤。本病是由于火热所致,主要有沸水(油)、火焰、电、放射线或化学物质等。轻则损害皮毛;甚则伤害骨肉筋骨;严重者,其火毒炽盛,体液失衡,气质失调,邪毒乘虚入内,影响内脏,引起其他疾病。由于火毒程度、作用时间,侵袭范围和深浅不同,引起局部及全身的病证有所不同。烧伤面积小而浅者,只需外治。严重烧伤者,必须内外同治。

(1) 火焰烧伤:如果烧伤程度较轻,没有形成水泡者,则尽快争取局部创面进行冷却和降温,宜用禹良土与葡萄醋调成糊状涂于患处;亦可宜用酸奶子加樟脑涂于局部或去皮大麦、白蜀葵花、金盏花叶用水煎取渣敷于患处。若烧伤面积较大,已形成水泡者,防止血液质浓化,宜用食盐、白砂糖、蜂蜜混合内服;方用买日合米 努热 软膏涂于水泡上;若水泡已破,局部成痂,方用买日合米 依斯皮达吉 软膏涂于局部。

(2) 开水烫伤:除了应用火焰烧伤的方药之外,可宜用木炭灰与蛋清混合以后外涂于患处;亦可宜用头发炭与蛋清混合后外涂于患处。

(3) 热油类烧伤:除了用以上述治疗方法之外,可宜用蛋清、橄榄油、铅粉等调成糊剂敷于患处。

(4) 药物烧伤:一般为檳如实汁烧伤、石灰烧伤。檳如实汁烧伤,首先用穿刺法,放出皮肤水泡中的水分,再方用买日合米 斯日开 软膏,涂于患处;石灰烧伤,先宜用亚麻车前草水清洗创面,然后方用热维改尼 巴达木 油、热维改尼 那尔吉力 油涂于患处。若石灰水误入眼部者,立即用水冲洗多次后,再滴用有关消毒汁液;若石灰粉误入眼部者,决不能用水冲洗,而是用干布擦去后再用加葡萄醋的水冲洗眼部即可。

(祖农卡日编写 阿不都热依木·卡地尔编译)

冻疮

本病维吾尔医学名为排萨地艾提拉非,是指在寒