

本品性二级湿寒,味酸。功能生湿生寒,清除异常胆液质,清热止痛,退热退烧,清胃降逆,润燥止吐,生湿止渴,润肠通便等。主治干热性或胆液质性疾 病,如热性头痛,发热发烧,胃热恶心、呕吐、口渴口臭、大便干结等。内服 10—30 枚。本品对寒性脑病、湿寒性胃病及寒性气质者有害,矫正药为洋乳香、乳香、玫瑰花浆、蜂蜜等。若本品缺货,可代用等量罗望实。本品可入果浆剂、汤剂、糖浆剂、浸泡剂等制剂。

实验研究:含有机酸(苹果酸、果胶酸)、鞣质、胡萝卜素、维生素 B、维生素 C、维生素 E、氰苷等。

(艾山·沙比尔 阿不都热依木·卡地尔编写

苏菲娅译 阿不都热依木·卡地尔编译

易沙克江·马合穆德审)

刺糖

刺糖,又称骆驼刺糖。维吾尔药物名洋塔克 西克日,别名台然吉本。为豆科植物骆驼刺 *Alhagi pseudoalhagi* (M. B.) Desv 茎枝的糖质分泌物。喜生于沙质土壤、戈壁、荒漠平原。我国分布于新疆、内蒙古、甘肃、青海等省区,国外原苏联、蒙古等亦有分布。

本品呈颗粒状,直径 1—5 mm,外表淡黄白色至棕黄色,易碎,内部呈乳白色至淡黄色,略有黏性,气微,味甜。常混有不易除掉的原植物的小刺,和倒卵形的革质小叶片。易溶于水。以色黄白、无枝叶泥沙杂质者为佳品。

本品性平,味甜。功能清除异常胆液质,润肠通便,退热止渴,止咳化痰,填精壮阳,肥体强身等。主治异常胆液质疾病,内热便秘,咳嗽顽痰,精液稀少,阳痿不举,身瘦体弱等。内服 24—48 g。本品对热性气质者有害,矫正药为罗望实、酸梅、酸枣。若本品缺货,可代用等量红糖、甘露糖、半量清泻山扁豆。本品可入泡剂、汤剂、糖浆剂、散剂等制剂。实验研究:经预试含大量糖及氨基酸。

(艾山·沙比尔编写 苏菲娅译

阿不都热依木·卡地尔编译

易沙克江·马合穆德审)

天山堇菜花

天山堇菜花,维吾尔药物名比乃非谢 古丽,别名古丽 比乃非谢。堇菜科植物天山堇菜 *Viola tianshanica* Maxim. 的干燥花。原植物我国主产新疆天山山脉,昆仑山和帕米尔高原及云南、四川、西藏,国外尼泊尔、克什米尔等地及中亚地区亦有分布。

本品性一级湿寒,味淡。功能生湿生寒,清除异常

胆液质,清热消炎,生湿通便,止咳化痰等。主治干热性或胆液质性疾 病,如乃孜乐性感冒、热性胸膜炎、肺炎、扁桃体炎和咳嗽、大便干结等。内服 7—14 g。本品用量过多可导致胃虚、心虚引起恶心,矫正药为椴椴、洋茴香、玫瑰花。若本品缺货,可代用莲花、牛舌草、铁线蕨。本品可入汤剂、糖浆剂、小丸剂、花膏剂等制剂。

实验研究:经预试验含挥发油、黄酮类、花青素等。

(阿不都热依木·卡地尔编写

易沙克江·马合穆德审)

牵牛

牵牛,维吾尔药物名艾西克皮且克,别名来比拉比、艾西克皮查尼、艾西克皮切。为旋花科植物裂叶牵牛 *Pharbitis nil* (L.) Choisy 或圆叶牵牛 *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt 的种子。原植物全国大部分地区均有分布。

本品性复杂,味苦。功能清除异常胆液质,消炎止痛,通便消肿等。主治胆液质性疾 病,如各种内脏炎肿,关节肿痛,肠道梗阻等。内服 3 g,汁液 10 ml。本品不宜多煎,泡水饮用或内服汁液为宜。本品对筋、头部、膀胱有害,矫正药为方糖。若本品缺货,可代用蜀葵。本品可入泡剂、汤剂(后下)、糖浆剂(后下)等制剂。

(艾山·沙比尔编写 苏菲娅译

阿不都热依木·卡地尔编译

易沙克江·马合穆德审)

罗望实

罗望实,又称酸角。维吾尔药物名台米日 印地,别名艾密里。为豆科植物酸角 *Tamarindus indica* L. 的成熟果实。多为栽培,少数野生于杂木林、田边。分布于我国广东、广西、福建等省区。国外印度、巴基斯坦亦有分布。

本品为不开荚果,类长圆形,稍扁,长 3—6 cm,微弯曲,外果皮棕褐色,稍坚硬;中果皮棕黄色或棕黑色,较厚,味酸,外侧有数条纤维状筋脉;内果皮革质状。种子形状多样,呈类圆形,长 7—14 mm,宽 6—11 mm,较扁,表面呈红棕色,光滑,有光泽,稍具指纹样纹理,压扁,两侧各具一近圆形疤痕,脐点呈圆点状,微凹入,合点亦为点状而微突起,位于脐点对侧,子叶白色。气芳香,味酸甜。加糖压制品呈较坚实块状物,如挑选可分出完整者,形如蚕豆,一般具 2—4 枚种子。气特异,强酸性,味甜。

本品性干寒,微酸。功能生干生寒,清除异常胆液质的热性和纯化异常的血液质,清热消炎,清热补