

腊肠树 *Cassia fistula* L. 的荚果。原植物我国分布于广东、云南等地,国外原产印度、马来西亚、泰国、缅甸,现非洲、美洲等地均有栽培。

本品干燥荚果圆柱形,长30—60 cm,直径1.5—2 cm,顶端尖,基部有时具木质状的果柄;表面暗褐色,平滑而带光泽,腹缝、背缝明显。果皮薄,硬而木质状。内有多数横隔;每隔有种子1粒,具长而暗色的珠柄,附着于腹缝。种子扁卵圆形,长约8 mm,阔约6 mm,厚约4 mm,赤褐色,光滑而质坚,内为淡黄色,胚乳角质状,胚弯曲。有特异臭。以干燥、完整、无柄、摇之不响者为佳。

本品性一级湿热,味甜而微酸。功能生湿生热,清除异常黑胆质,软坚消肿,攻泻通肠,通经调经,祛寒止痛,润肺止咳等。主治干寒性或黑胆质性疾,如各种炎肿,大便干结,经水不下,经水不畅,关节酸痛,咽喉干痛,咳嗽气喘等。①解胸闷,强肌腱,减慢血液循环,消口腔、咽喉、内脏热性炎症,轻泻。②配有关药物使用可泻各种黏性物质。③配蜜枣使用驱胆质。④配盒果藤根使用化痰。⑤配水龙骨、蒲公英汁、柳树叶汁使用清除黑胆质。⑥配郁金香花根须,椴椴籽、车前子等的汁和巴旦杏油使用除肠梗阻伴有腹痛。⑦配蒲公英叶汁、龙葵汁和菟丝子汁使用清肝并镇痛、除黄疸和治伤寒。⑧调鲜芫荽汁漱口除咽喉嘶哑。⑨配山羊奶、无花果汁使用治喉部炎肿。⑩研末制成糊剂外敷治关节痛及热性炎症,如配龙葵汁外敷其效果更佳。

内服10—20 g,外用适量。本品对胃有害,能引起腹痛、恶心和里急后重。胃部不适时加乳香、洋茴香,腹痛时加巴旦杏油加以矫正。若本品缺货,可代用三倍葡萄干(配少许盒果藤果),或半量骆驼刺糖。本品可入汤剂、蜜膏剂、浸剂、漱口剂、散剂等制剂。

实验研究:本品果肉可达30%,其成分蔗糖与转化糖为40%—60%,还含枸橼酸、鞣酸和色素,含芦荟大黄素苷(barbaloin)、甲氧基蒽醌(methoxy anthraquinone)约1%。种子含树胶约27%,其组成为半乳糖约24%、甘露糖约76%,果肉尚含不饱和酸。树皮含缩合型鞣质约10%,其组成单位是3,4-二羟基黄烷类,并分离出腊肠豆素(fistucacidin),心木亦含腊肠豆素并含芦荟大黄素及大黄酸(rhein)。此外还含鼠李柠檬素(rhamnocitrin)、鼠李孕激素(rhamnolutin)、鼠李白杨素(rhamnochrysin)等。

果或果肉有泻下作用(含蒽醌苷),但量大可引起恶心、胃肠气胀及腹痛;其水-醇提液(1:1)予小鼠腹腔注射10—20 ml/kg可引起中毒:表现为抑制,步态不稳,呼吸困难,24小时后恢复正常。对离体豚鼠小肠及兔十二指肠有兴奋作用。0.1 ml可抑

制兔心,但可恢复。对小鼠腹腔注射10 ml/kg可延长巴比妥引起的睡眠作用。果实有抗菌作用,可抑制金黄色葡萄球菌、白喉杆菌、伤寒及副伤寒杆菌、大肠杆菌的生长。

(艾山·沙比尔 阿不都热依木·卡地尔编写

苏菲娅译 阿不都热依木·卡地尔编译

易沙克江·马合穆德审)

紫苏

紫苏,维吾尔药物名巴兰古。为唇形科植物野紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *acuta* (Thunb.) Kudo 或回回苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *crispa* (Thunb.) Decne. 等的全草。我国主产于新疆、湖北、江苏、河南、山东、江西、浙江、四川等地,国外主产于印度等国。

本品性一级末湿热,味辛、甘。功能生湿生热,清除异常黑胆质,补脑补心,爽心悦志,除肠疡等。主治干寒性或黑胆质性疾,如干寒性脑虚、心虚、心悸、肠疡等。内服4—5 g。本品对胃有害,矫正药为白冰糖。若本品缺货,可代用罗勒。本品可入汤剂、煎剂、糖浆剂、散剂等制剂。

(艾山·沙比尔编写 苏菲娅译

阿不都热依木·卡地尔编译

易沙克江·马合穆德审)

水龙骨

水龙骨,维吾尔药物名白斯法也吉,别名别斯提法也。本品为水龙骨科植物欧亚水龙骨 *Polypodium vulgare* L. 的干燥根茎。我国主产于新疆,国外主产于欧洲地区及美国、印度等国。除了欧亚水龙骨外,尚有下列同属植物在有些地区亦同等入药,普通水龙骨 *Polypodium niponicum* (Mett) Ching 使用于华中、华东、华南和华西,中华水龙骨 *Polypodium Pseudoamoenum* Ching 使用于陕西。

本品呈细圆柱状,稍弯曲,有分枝或不分枝,长5—10 cm,直径3—4 mm。表面棕黄色至棕褐色,有纵皱纹,一侧有须根痕或少数残留的须根。质硬而脆,易折断,断面较平滑,黄色至黄绿色。气微,味甜。

本品性干热,味辛。功能生干生热,清除异常黑胆质和黏液质,补脑,补心,爽心悦志,祛风净血等。主治寒性或黑胆质和黏液质性疾,如心脑两虚、忧郁症、瘧病、关节疼痛、麻风、皮肤瘙、痔疮等。内服5—15 g,外用适量。本品对肺和肾有害,矫正药为黄柯子、铁线蕨。若本品缺货,可代用菟丝草。本品可入汤剂、小丸剂、蜜膏剂、散剂、油剂、软膏等制剂。

实验研究:欧亚水龙骨根茎含 β -谷甾醇、7-脱氢胆甾醇(7-dehydrocholesterol)、岩皂甾醇(fucosterol)、岷柠檬甾二烯醇(citrosadienol)、欧亚水龙骨甜素(osladin)等。对动物有降低血糖及胆固醇作用。对小鼠和大鼠试验表明无抗肿瘤作用。

(艾山·沙比尔 阿不都热依木·卡地尔编写
苏菲娅译 阿不都热依木·卡地尔编译
易沙克江·马合穆德审)

菟丝草

菟丝草,维吾尔药物名色日合月改,别名艾非提蒙、库苏斯、阿卡斯比里。为旋花科植物菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam. 及其同属植物的干燥地上部分。寄生于亚麻以及其他的一些草本植物,国内外大部分地区均有分布。

本品性二级干热,味辛。功能清除异常黑胆质或异常黏液质,散气通阻,解郁除狂,爽心悦志,清脑安神,软坚消肿等。主治黑胆质性或黏液质性疾病,如寒性忧郁症、神经病、抽筋、失眠、硬性炎肿等。内服9—12g。本品不宜多研、多煎,装入布袋后下。本品适合于寒性气质者、年老者及50岁左右者,不宜用于胆液质性气质者、热性气质者、身患肺病者和儿童。若需用,需配阿拉伯胶、西黄耆胶。若本品缺货,可代用青金石、亚美尼亚石、半量麝香草。本品可入汤剂、泡剂、诃子膏剂、蜜膏剂、蒸露剂、糖浆剂等制剂。

(艾山·沙比尔编写 苏菲娅译
阿不都热依木·卡地尔编译
易沙克江·马合穆德审)

补脑药(木开维亚提 地马克)

凡能补脑,增强精神力的药物,称补脑药。本类药物一般具有开窍、安神、爽心、增知、解郁、除癩、强筋、养肌、除搐、除颤、降压、催眠、壮阳等作用。用于脑虚而引起的各种病证,主要药物有:龙涎香、海狸香、人参、赤芍、没药枝、乳香、丁香罗勒、蜘蛛香、甘松、黄华柳、肉豆蔻衣、香附、沉香、阿月浑子、胡桃仁、白罗勒、圆根马兜铃等。

此外,本类药物还可包括有些兼有补脑功能的药物,主要有:甜巴旦杏仁、西瓜子仁、薰衣草、欧细辛、芫荽、葡萄、余甘子、棉花子仁、西青果、黄河子皮、喀布尔诃子皮、白罌粟子、黑罌粟子、羊奶、白檀香、葫芦子仁、麝香、藏红花、鸡肉、莴苣子仁、酸橙、欧榛仁、葫芦子仁、香青兰叶、猫儿草、珍珠、玫瑰花、姜、贾如实、紫苏子、鸟类动物脑、石菖蒲、丁香、竹鸡、玫瑰花、苹果花、梨花、椴椴花、菝葜、樟脑、牛舌草叶、

香桃木实、洋甘菊、小豆蔻、白芝麻等。

(阿不都热依木·卡地尔 阿不都哈力克·司马义编写
阿不都热依木·卡地尔编译 易沙克江·马合穆德审)

龙涎香

龙涎香,维吾尔药物名安白尔,别名安白尔艾西艾比。为鲸亚目海洋动物抹香鲸 *Physeter catodon* L. 的肠道分泌物干燥品。原动物主要活动于热带、亚热带和温带海洋中,分布于各大洋,我国东海与南海均有分布。

本品为抹香鲸的肠内分泌物,捕杀后及时收集该分泌物(龙涎香),经干燥即成不规则块状,新鲜者气味较差,须于密闭容器贮存1—2年后则色变为琥珀色、香气浓郁而幽雅者为佳品。干燥的龙涎香呈不透明的蜡状胶块,色棕褐如琥珀,有时具五彩斑纹。质脆而轻,嚼之如蜡,黏牙;气微腥,味带甘酸。比重0.7—0.9,熔点为60℃,可溶于纯酸中。点燃时有蓝色火焰,香气四溢,酷似麝香而幽雅,被熏之物,能保持久之芳香。以棕褐色、体轻质韧、焚之幽香浓郁者为佳。较新鲜的龙涎香呈类灰色或类棕色的不规则团块,据称久贮为佳。

本品性二级干热,气芳香。功能生干生热,芳香开窍,补脑安神,增强记忆,爽心解郁,养神壮阳等。主治湿寒性或黏液质性脑、心、神经疾病,如脑心两虚,神经衰弱,记忆减退,心慌忧郁,心理性阳痿等。内服0.1—0.5g,外用适量。本品用量过多或长期使用对肝、肠有害,矫正药为阿拉伯胶、天竺黄。若本品缺货,可代用麝香。本品可入小丸剂、爽心膏、糖膏、消食膏、鼻闻剂等制剂。

实验研究:本品含龙涎香醇(anberin)约25%,为甾醇类化合物,熔点82℃—83℃,醚中不溶物10%—16%,表粪甾醇(epicoprosterol)30%—40%,粪甾醇(coprosterol)1%—5%,粪甾酮6%—8%,挥发性成分有二氢-r-紫罗兰酮(dihydro-r-lonone)、龙涎香醛、龙涎香酯(ambeinolide)、龙涎香烷(amdrane)和无机盐等。

本品的药力作用与麝香类似,小剂量对动物中枢神经系统有兴奋作用,大量则出现抑制,对离体蛙心有强心作用,对整体动物引起血压下降。

(艾山·沙比尔 阿不都热依木·卡地尔编写
苏菲娅译 阿不都热依木·卡地尔编译
易沙克江·马合穆德审)

海狸香

海狸香,又名河狸香,维吾尔药物名昆都孜开合日,别名准地比代斯台尔。为河狸科动物欧亚河狸