

pentene)、柠檬烯(limonene)、桂皮醛(cinnamaldehyde)、罕没药烯(heerabolenene)等。树胶水解得阿拉伯糖、半乳糖和木糖。

据报道,桂皮醛对小鼠有明显镇痛、抗真菌、抗肿瘤作用,50 μg/ml 给小鼠注射,对 SV<sub>40</sub> 病毒引起的肿瘤的抑制率为 100%。枯醛有抑制或杀灭细菌和真菌作用。丁香醛具有抗菌作用,在 1:8 000—1:1 600 浓度时,对致病性真菌有抑制作用,在 1:2 000—1:8 000 浓度时,对金黄色葡萄球菌及肺炎、痢疾(志贺氏)、大肠、变形、结核等杆菌均有抑制和健胃作用等。

(艾山·沙比尔 阿不都热依木·卡地尔编写  
苏菲娅译 阿不都热依木·卡地尔编译  
易沙克江·马合穆德审)

## 乳香

乳香,又名乳头香。维吾尔药物名因都尔,别名因都如斯。为橄榄科植物卡氏乳香树 *Boswellia cartieri* Birdw. 及同属植物的皮部切伤后渗出的油胶树脂。我国不产,国外主产于索马里、埃塞俄比亚及阿拉伯半岛南部。

本品性一级干二级热,味辛、苦。功能生干生热,增强记忆,平喘止咳,收敛生肌,补胃消食等。主治湿寒性或黏液质性脑部疾病,如湿性脑虚、记忆下降,寒性气喘、短咳、支气管扩张,各种疮疡、胃脘虚弱、消化不良等。内服 1—6 g,外用适量。本品用量过多,可导致血液质和黏液质的烧焦,并对热性气质者引起头痛,矫正药为砂糖。若本品缺货,可代用洋乳香。本品可入蜜膏、糖膏、散剂、消食膏、滴剂、敷剂、栓剂、眼粉、软膏等制剂。

实验研究:乳香含树脂 60%—70%、树胶 27%—35%、挥发油 3%—8%。树脂的主要 α、β 成分为游离 α、β-乳香脂酸(α、β-boswellic acid),结合乳香脂酸 1.5%、乳香树脂烃(olbanoresene)33%。树胶为阿糖酸(arabic acid)的钙盐或镁盐 20%、西黄耆胶黏素(bassorin)6%;挥发油呈淡黄色、具芳香,含蒎烯(pinene)、二戊烯(dipentene)及 α、β-水芹烯(α、β-phellandrene)等。

(阿不都热依木·卡地尔编写  
易沙克江·马合穆德审)

## 丁香罗勒

丁香罗勒,维吾尔药物名排然吉木西克,别名巴兰古依 伙尔德、拉木 土里斯。为唇形科植物丁香罗勒 *Ocimum gratissimum* L. var. *suave willd* 的全草。分布于我国南方省区,国外分布于非洲、印度、沙特

阿拉伯、巴西等地。

本品性二级末干热。功能生干生热,补脑通脑,安心除烦,通鼻解表,止咳化痰,补胃开胃,散气补肝等。主治湿寒性或黏液质性脑部疾病,如脑虚脑阻,心悸恐惧,及鼻塞感冒,咳嗽多痰,胃虚纳差,肝虚气滞等。内服 5 g。本品可引起头痛,胃泛酸水。矫正药为天山堇菜、葡萄醋。若本品缺货,可代用紫苏。本品可入汤剂、糖浆等制剂。

(艾山·沙比尔编写 苏菲娅译  
阿不都热依木·卡地尔编译  
易沙克江·马合穆德审)

## 蜘蛛香

蜘蛛香,又称马蹄香。维吾尔药物名孙布力 节比里,别名孙布力 库依、台改尔。为败酱科植物心叶缬草 *Valeriana jatamansi* Jones 干燥的根茎和根。我国主产于四川、贵州、陕西、河南、湖北、云南、西藏、广西等省区,国外主产于印度和有些欧洲国家。

本品性二级干热,味辛。功能生干生热,补脑补心,降压安神,通尿通经,健胃开胃,补肝利水等。主治湿寒性或黏液质性脑、心疾病,如脑虚、心虚、气急、心律不齐、高血压、神经衰弱和寒性闭尿、闭经及湿性胃虚纳差、肝虚腹水等。内服 3—5 g,外用适量。若本品缺货,可代用欧缬草。本品可入蜜膏、糖浆、片剂、小丸、敷剂、洗剂、散剂等制剂。

实验研究:马蹄香根茎和根均含挥发油,根中约 0.81%,根式中约 0.36%,此外,尚含缬草醚酯(valtrate)、二氢缬草醚酯(didrovaltrate)缬草苦苷(vale-rosidate)、蒙花苷(linarin, Acaciin)及其异戊酸酯(linarin valerianate),还有异戊酰氧基异戊酰异二氢缬草醚酯(iVHD-Valtrate)。

(阿不都热依木·卡地尔编写  
易沙克江·马合穆德审)

## 甘松

甘松,维吾尔药物名孙布力 其尼,别名孙布力 斯尼。为败酱科植物甘松香 *Nardostachys chinensis* Batal. 的根茎和根。我国分布于西南部,即主产于四川;此外,甘肃、青海、西藏等省区亦产。

甘松香干燥的根茎及根,全形弯曲如虾,上粗下细。根茎上附有地上茎残基及多层的枯叶残基,长为 1—2 cm;外层棕黑色,内层棕色至黄色;呈狭长膜质片状或纤维状。地上茎残基中空,显棕色。主根条柱形,单一,有的数股交结,并列或分枝,长为 5—13 cm;表面皱缩,呈棕褐色,常裂成片状;中心木质部灰棕色,老根下部为单一中柱,而上部有 2—4